



1. Identificación y descripción del procedimiento

En el pene se pueden desarrollar procesos tumorales. Mediante esta técnica se extirpa parcial o totalmente el pene. Raramente es necesario extirpar escroto y testículos. Ocasionalmente se requiere linfadenectomía locoregional, (extirpación ganglionar).

La incisión se realiza en la piel peneana o penoescrotal (penectomía total). En este último caso se requiere el abocamiento de la uretra al periné.

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

Eliminación del tumor peneano con un margen de seguridad.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

Otras alternativas a este procedimiento puede ser la láserterapia o la radioterapia.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Además de las ya mencionadas en los apartados uno y dos de este documento, observará un acortamiento en la longitud del pene.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el facultativo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles. No obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es en último término libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó o de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer y su alcance, son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital.

6. Riesgos

De dicha intervención es posible pero no frecuente esperar los siguientes efectos secundarios o complicaciones:

- Persistencia de las molestias en el pene
- Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestésias (aumento de la sensibilidad) o hipoestésia (disminución de la sensibilidad)
- Hinchazón o necrosis de la piel del pene
- Disminución de la capacidad para mantener la erección.
- Estenosis del nuevo meato uretral
- Necesidad de tener que orinar sentado en caso de muñón pequeño o abocamiento perineal de la uretra.
- Infección de la herida que podría ocasionar defectos estéticos.
- Hemorragia de diversos grados. Las consecuencias de dicha hemorragia son muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como consecuencia directa del sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados.

De los riesgos anestésicos será informado por el Servicio de Anestesia.

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio. Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada...) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo quirúrgico general es mayor.

9. Declaración de consentimiento

Don/doña de años de edad, con domicilio en , DNI y nº de SIP

Don/doña de años de edad, con domicilio en en calidad de (representante legal, familiar o allegado de la paciente) , con DNI

Declaro:

Que el Doctor/a me ha explicado que es conveniente/necesario, en mi situación la realización de

y que he comprendido adecuadamente la información que me ha dado.

En a de de 2

Fdo.: Don / doña DNI

Fdo.: Dr/a DNI

Colegiado nº:

10. Revocación del consentimiento

Revoco el consentimiento prestado en fecha de de 2 y no deseo proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizado.

En a de de 2

Fdo. el médico

Fdo. el/la paciente

Colegiado nº:

